

الا بذكرا... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مامایی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

(گروہ الف)

١٥٠ تعداد سؤالات:

زمان: ۱۳۰ دقیقه

٢٣ تعداد صفحات:

مشخصات داوطلب

نام:.....

.....نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفا قبل از شروع پاسخگویی ، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

۸۷ ماهی داری خبر

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

روشهای مامایی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۸ - کدام مورد جزء غربالگری های روانی - اجتماعی در مادران باردار نیست؟

- (الف) وجود مشکل برای حضور در ویزیتها
- (ب) تغییر مکرر محل سکونت در یک سال گذشته
- (ج) استفاده از دخانیات در ۲ ماه گذشته
- (د) بررسی وضعیت پسامد خوراکی

سؤال ۹ - خانمی مولتی پارどوم (P2) با شکایت درد شدید در قسمت تحتانی راست شکم در روز اول قاعده‌گی خود مراجعه کرده است. فشارخون $110/60$ و نبض 80 است. در معاینه خونریزی اندک مشاهده شده، حرکت سروپیکس در دنک نیست و درد و حساسیت سمت راست مانع از لمس قوده در آدنکس است. محتمل ترین تشخیص چیست؟

- (الف) حاملگی نابجا
- (ب) تهدید به سقط
- (ج) مول
- (د) PID

سؤال ۱۰ - خانمی ۴۵ ساله حاملگی سوم (G3) بدون سابقه فشار خون با حاملگی ۱۶ هفته و سابقه لکه بینی به مدت ۶ هفته با خونریزی واژینال و دفع نسیج مراجعه کرده است. ظاهر او آنمیک بوده و نبض 90 و فشار $130/90$ دارد. ارتفاع رحم مطابق با سن حاملگی و خونریزی واژینال مشهود است و FHR سمع نمی‌شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- (الف) مول
- (ب) تهدید به سقط
- (ج) سقط غیرقابل اجتناب
- (د) حاملگی خارج رحمی

سؤال ۱۱ - چه عاملی بر میزان آلفا فیتوپروتئین سرم مادر اثر ندارد؟

- (الف) سن مادر
- (ب) فشار خون بالا
- (ج) تعداد جنین
- (د) نژاد مادر

سؤال ۱۲ - در ارزیابی‌های سلامت جنین کدام مورد غلط است؟

- (الف) تست استرسی انقباضی مثبت = وقوع افت دیررس حداقل در 50% انقباضات
- (ب) تست بدون استرس طبیعی = حداقل ۲ تسریع در حد ۱۵ ضربه در دقیقه و هر کدام به مدت ۱۵ ثانیه
- (ج) پروفیل بیوفیزیکی با امتیاز 8 از 10 و مایع کافی = جنین طبیعی و بدون آسفکسی
- (د) در بررسی سونوگرافیک مایع آمینون وجود شاخص مایع آمینونی زیر 8 سانت = الیگوهیدرآمینوس

سؤال ۱۳ - چه اطلاعاتی در طی مانورهای لئوپلد بدست می‌آید؟

- (الف) پرزاتاسیون، قرار، پوزیشن و آنگاشمان
- (ب) پرزاتاسیون، قرار، پوزیشن و آنگاشمان
- (ج) ارتفاع رحم، پوزیشن، انگاشمان و حالت
- (د) قرار، پوزیشن، چرخش داخلی و نزول

سؤال ۱۴ - خانمی G2 با حاملگی 28 هفته و 6 روز با شکایت از دردهای شکمی احتمالاً مربوط به شروع زایمان مراجعه کرده است. کدام اقدام لازم نیست؟

- (الف) بررسی مشخصات انقباضات رحمی و توشه واژینال.
- (ب) تجویز تست شمارش حرکات جنین به مدت ۱ ساعت.
- (ج) تجویز مسکن به منظور رفع دردها.
- (د) پایش الکترونیک خارجی حداقل ۱ ساعت.

سؤال ۱۵ - در خصوص مراقبت های معمول حین لیبر کدام مورد غلط است؟

- (الف) گلوکز، سدیم و آب (سرم) به میزان ۱۲۰-۶۰ میلی لیتر در ساعت.
- (ب) خوردن مقادیر اندک مایعات صاف شده (بدون تفاله).
- (ج) تجویز داروهای از بین برنده یا کاهش دهنده درد زایمان.
- (د) انتخاب پوزیشن و وضعیت بدنی به دلخواه مادر.

سؤال ۱۶ - خانم ۳۶ هفته با کنترالشن های شدید رحمی و مرگ داخل رحمی جنین مراجعه کرده است، در معاینه خونریزی واژینال مشهود نیست و دیلاتاسیون ۳ تا ۴ سانتی متر می باشد، کدامیک از اقدامات زیر اولویت دارد؟

- (الف) بررسی فاکتورهای انعقادی و تجویز فراورده های خونی در صورت لزوم.
- (ب) ختم حاملگی به صورت سزارین اورژانس.
- (ج) آگنتیشن و ختم حاملگی از طریق زایمان واژینال.
- (د) تحت نظر گرفتن بیمار و دادن فرصت برای ختم خود به خودی حاملگی.

سؤال ۱۷ - کدامیک از موارد زیر کنتراندیکاسیون نسبی ورزش هوازی در دوران بارداری محسوب می شود؟

- (الف) BMI کمتر از ۱۶
- (ب) هیپرتیروئیدیسم کنترل شده
- (د) دیابت میلتوس کنترل شده
- (ج) آنمی شدید

سؤال ۱۸ - در خانم مبتلا به پره اکلامپسی شدید درصورتی که سزارین اندیکاسیون پیدا کند کدامیک از روش های زیر را مناسب می دانید؟

- (الف) بی هوشی عمومی
- (ب) آنالژزی اپیدورال
- (ج) بلوك ساب آرکنوئيد
- (د) بلوك پودنال

سؤال ۱۹ - خانمی ساعت ۵ بعد از ظهر روز گذشته زایمان طبیعی داشته است از ساعت ۱۲ نیمه شب گذشته دچار تب ۳۹°C همراه با تورم و پر خونی پستان می باشد کدامیک از توصیه های زیر را مناسب تر می دانید؟

- (الف) ادامه شیردهی و یا تخلیه پستان و بررسی از لحاظ سایر علل تب.
- (ب) ادامه شیردهی و یا تخلیه پستان و آنتی بیوتیک تراپی.
- (ج) قطع شیردهی و یا عدم تخلیه پستان و بررسی از لحاظ سایر علل تب.
- (د) قطع شیردهی و یا تخلیه پستان و آنتی بیوتیک تراپی.

سؤال ۲۰ - خانم شکم اول، ۴ ساعت بعد از زایمان طبیعی موفق به دفع خود به خود ادرار نگردیده است پس از قرار دادن کاتتر^{۳۰} ۲۰۰۰ ml ادرار دفع شده است کدامیک از اختلالات زیر غیر محتمل می باشد؟

- (الف) عملکرد نامناسب مثانه
- (ب) هماتومناژیه اپیزیاتومی
- (د) احتباس ادرار پس از زایمان
- (ج) نارسایی کلیه

سؤال ۲۱ - افزایش فشار خون در کدامیک از موارد تغییر وضعیت زیر وقوع هیپرتانسیون بارداری را پیشگویی می کند؟

- (الف) خوابیده به پهلو به خوابیده به پشت
- (ب) خوابیده به پشت به خوابیده به پهلو
- (ج) نشسته به خوابیده
- (د) خوابیده به نشسته

سؤال ۲۲ - در یک خانم مولتی پار دچار دیستوشیا در چه صورت احتمال وجود CPD و توصیه برای سازارین بیشتر است (بر اساس معنار فریدمن)؟

- الف) سرعت دیلاتاسیون کمتر از $1/5$ سانتی متر در ساعت
 ب) نزول کمتر از 2 سانتی متر در ساعت
 گ) توقف ثانویه دیلاتاسیون بیش از یک ساعت
 د) توقف نزول بیش از یک ساعت

سؤال ۲۳- تقدیم بحرانی برای آنتی بادی‌های آنتی D معمولاً چه میزان است؟

- ١٦) ب) $\frac{1}{\lambda}$ الف) $\frac{1}{\lambda}$
١٧) د) $\frac{1}{2\lambda}$ ج) $\frac{1}{2\lambda}$

سوال ۲۴- کدامک از موارد زیر در مورد انقضایات صحیح است؟

- الف) ممکن است این انقباضات برای رد کردن حاملگی نابجای شکمی مفید باشد.

ب) دفعات بروز انقباضات با انقباضات ناشی از میومهای رحمی مقاومت هستند.

ج) شدت انقباضات با ماساژ دادن رحم تغییرنامی کند.

د) دفعات انقباضات در اوایل صبح بیشتر است.

سوال ۲۵ - میزان متوسط خونریزی در مورد زایمان سزارین جنین تک چلو چقدر است؟

- الف) ٥٠٠ ميلي متر
ب) ٧٥٠ ميلي متر
د) ١٥٠٠ لتر

سؤال ۲۶- در کدام مورد ارتفاع رحم بیزدگت از سن حاملکی نبست؟

- الف) جنین های چند قلوئی
ج) LMP اشتباه

ب) مثانه پر
د) جفت سر راهی

سؤال ۲۷ - دلیل اصلی افزایش خطرهای جنینی در حاملگی post term چیست؟

- الف) نارسائی جفت
ب) فشردگی بندناف در اثر الیگوهدر آمینوس
ج) کیست های بندناف و جفت
د) کاهش قطر بندناف

سؤال ۲۸- معیارهای زیر جهت سندروم ترانسفورمیون قل یه قل قل از تولد صحیح است، بجز:

- الف) تفاوت وزن بیش از ۲۰٪
 ب) تفاوت میزان هموگلوبین بیش از ۵٪
 ج) هیدرآمینوس در قل بزرگتر و الیگوهیدرآمینوس در قل کوچکتر
 د) چفت دی کوربیونیک

سؤال ۲۹ - در کدامک از وضعیت‌های زیر می‌روندۀ قلی دو زنان حامله بیشتر است؟

- الف) خوابیده به پهلو
ج) خوابیده به بیشت

ب) ایستاده
د) فرقی، نمی کند.

سؤال ۳۰ - خانم ۳۶ هفته با محدودیت رشد جنین و اولیگوهیدروامینوس شدید مراجعه کرده است، در صورتیکه طرح ضربان قلب جنین اطمینان بخش باشد کدامیک از اقدامات زیر را پیشنهاد می‌کنید؟

- (الف) ختم حاملگی از طریق سزارین
- (ب) ختم حاملگی از طریق زایمان واژینال
- (ج) خودداری از هرگونه دخالت تا اطمینان از بلوغ ریه جنین
- (د) غربالگری از نظر سندروم TORCH

سؤال ۳۱ - در مورد سندروم AN - HAIR کدام عبارت صحیح است؟

- (الف) هایپرآندروژنیسم - مقاومت به انسولین - GII مختلف
- (ب) هایپرآندروژنیسم - مقاومت به انسولین - آکانتوزنیگریکانس
- (ج) هایپرآندروژنیسم - هیرسوتیسم - مقاومت به انسولین
- (د) آکانتوزنیگریکانس - عدم تخمک گذاری - هایپرآندروژنیسم

سؤال ۳۲ - بعد از پیدایش صفات ثانویه جنسی کدامیک از موارد اعل نارسایی تخدان بشمار فرمی رود؟

- (الف) سندروم Savage
- (ب) واسکولیت دیابتی
- (د) اختلالات خود ایمنی
- (ج) عفونتها

سؤال ۳۳ - بی اختیاری استرسی ادرار از عوارض کدام دسته از داروهاست؟

- (الف) الكل
- (ب) آگونیستهای آلفا در درمان سرماخوردگی
- (د) بلوکرهای کانال کلسیم
- (ج) بتابلوکرهای در درمان هایپرتانسیون

سؤال ۳۴ - خانمی که با ناراحتی درد شکم حداقل به مدت ۱۲ هفته در ۱۲ ماه گذشته مراجعه نموده که به گفته بیمار با دفع مدفعه تسکین می‌یابد و دفعات دفع مدفعه وی نیز تغییریافته است، تشخیص چیست؟

- (الف) پیوست عملکردی
- (ب) روده تحریک پذیر
- (د) اختلال عملکرد آنورکتال
- (ج) اسهال عملکردی

سؤال ۳۵ - دختری ۱۴ ساله فاقد صفات ثانویه جنسی و عدم منارک مراجعه نموده تشخیص چیست؟

- (الف) اختلال بلوغ
- (ب) تکامل تا همزمان بلوغ
- (د) بلوغ هموسکسوال
- (ج) بلوغ هتروسکسوال

سؤال ۳۶ - خانمی ۲۸ ساله با شکایت آمنوره ثانویه ، صفات ثانویه جنسی و یافته های معاینه لگنی طبیعی مراجعه نموده ، تست حاملگی وی منفی است و در آزمایشها انجام شده هیپرپرولاکتینمی همراه با افزایش TSH مشاهده می شود درمان مناسب چیست؟

- (الف) در مرحله اول درمان هیپوتیروئیدی
- (ب) درمان هیپرپرولاکتینمی و هیپوتیروئیدی همزمان
- (د) انجام آزمایشات تکمیلی
- (ج) در مرحله اول درمان هیپرپرولاکتینمی

سؤال ۳۷ - مکانیسم کاهش باروری در آندومتریوز متوسط یا شدید چیست؟

- (الف) چسبندگی در ناحیه تخدانها و لوله های رحمی
- (ب) نارسایی مرحله فولیکولار
- (د) افزایش میزان E₂ خون در مرحله قبل از تخمک گذاری
- (ج) سیکلهای نامنظم قاعده‌گی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

وشهه مامایی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۳۸ - کدام مورد از معیارهای اصلی تشخیص PCOS بشمار می‌رود؟

(الف) افزایش شبیت LH به FSH - هیپرآندروژنی

(ب) مقاومت به آنسولین - عدم تخمک گذاری

(ج) عدم تخمک گذاری مزمن - هیپرآندروژنی

(د) عدم تخمک گذاری متناوب - مقاومت به آنسولین

سؤال ۳۹ - کدام جمله در مورد تریکومونیاز صحیح است؟

(الف) فقط عقوتهای علامت دار درمان شوند.

(ب) عقوتهای علامت دار و بدون علامت باید درمان شوند.

(ج) درمان شرکای جنسی توصیه نمی‌گردد.

(د) واژینیت علامت دار شیوع بیشتری دارد.

سؤال ۴۰ - مرحله پایانی PID، کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

(ب) آندوسروسیت

(د) آبسه لوله - تخدمانی

(الف) آندومتریت

(ج) لکوسیتوز

سؤال ۴۱ - کدامیک از موارد زیر در فوجوانان بیشتر مشاهده می‌شود؟

(ب) کیست عملکردی تخدمان

(د) میومهای رحمی

(الف) آندومتریوز

(ج) نئوپلاسم‌های بدخیم

سؤال ۴۲ - کدامیک از کیستهای تخدمانی ممکن است همراه با حاملگی مولار باشد؟

(ب) جسم زرد

(د) درموئیدی

(الف) فولیکولار

(ج) تکالوتئنی

سؤال ۴۳ - موارد زیر در مورد میومهای رحمی صحیح است بجز:

(ب) بیشتر آنها بدون علامت هستند.

(الف) از شایعترین تومورهای رحمی هستند.

(د) از علل مهم نازایی هستند.

(ج) در زنان چاق ممکن است شایعتر باشد.

سؤال ۴۴ - در مورد خطر ایجاد سرطان میکروسکوپی در پستان مقابل بیمار دارای سابقه ابتلا به سرطان پستان کدام جمله صحیح است؟

(الف) حدود ۲۰-۲۵ درصد افزایش احتمال خطر دارد.

(ب) میزان پرور آن در کارسینومای لوبلولار بیش از داکتال است.

(ج) احتمال افزایش خطیر ندارد.

(د) افزایش احتمال خطر مربوط به سنین ۵۰-۶۰ سال به بالا است.

سؤال ۴۵ - داشتن کدامیک از سرطانها سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان نمی‌شود؟

(ب) سرویکس

(د) کولون

(الف) آندومتر

(ج) تخدمان

جنین شناسی

سؤال ۴۶- در کدام ناهنجاری، دهلیز و بطن راست شدیداً هیپرتروفی شده و قلب چپ رشد نمی‌کند؟

(الف) آترزی دریچه سلتی

(ب) تنگی دریچه هلالی شریان ریوی

(الف) بسته شدن زوررس سوراخ بیضی

(ج) آترزی دریچه دولتی

سؤال ۴۷- منشاء جنینی قسمت طرفی لب فوقانی کدام گزینه زیر است؟

(الف) بر جستگی داخلی بینی

(ب) بر جستگی خارجی بینی

(ج) قطعه ماندیبولا

(د) قطعه ماندیبولا

سؤال ۴۸- ترشح سورفاکتانت از کدام سلول‌ها و در چه زمانی شروع می‌شود؟

(الف) نوموسیت‌های نوع I و II از هفته ۲۲ جنینی به بعد

(ب) نوموسیت‌های نوع I از هفته ۲۶ جنینی به بعد

(ج) نوموسیت‌های نوع II از هفته ۱۸ جنینی به بعد

سؤال ۴۹- تمام موارد زیر از مجاری پارامزونفریک (مولر) بوجود می‌آیند، بجز:

(Appendix of testis) (الف) زائدۀ اپیدیدیم

(Appendix of epididymis) (ب) زائده بیضه

(Cervix) (ج) گردن رحم

(Utriculus prostaticus) (د) رحم پروستاتیک

سؤال ۵۰- تمام گروه‌های نورومنی زیر در صفحات قاعده‌ای منطقه‌ی میلن سفالن وجود ندارند، بجز:

(الف) واپران جلدی (Somatic efferent)

(ب) واپران احساسی اختصاصی (Special Visceral efferent)

(ج) آوران احساسی (Visceral Afferent)

(د) واپران احساسی عمومی (General Visceral efferent)

سؤال ۵۱- منشاء سلول‌های لیدیگ کدام است؟

(الف) آپی تلیوم سلومیک

(ب) مزودرم احساسی

(ج) مزودرم حد واسط

(د) ستیغ عصبی

(الف) فیستول مروی - نایی

(ب) آترزی مروی

(ج) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی مروی

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

(ج) آترزی نای

(د) آترزی نای

(الف) آترزی نای

(ب) آترزی نای

سؤال ۵۵ - اتصال اولیه بلاستوستیت به رحم توسط کدام مورد زیر انجام می‌شود؟

- Selectin (پ)
Integrin (د)

Lectin (الف)
Cadherin (ز)

نوزادان و مراقبت‌های مردم‌الطه

سوال ۵۶ - تست اختصاصی زرای تشخیص سفلیس نوزادی کدام است؟

- الف) VDRL خون بند ناف
ج) واکنش زنجیره بلیمر از مایع آمینون

سوال ۵۷- احتماً، ابتلاء نوکلی بیس به بیماری کمپود G6PD می‌باشد. به بیماری که میزان است؟

- الف) %
ج) %٥٠
د) %١٠٠
ب) %٢٥

سؤال ۵۸ - نوزادی مدتی پس از زایمان واژینال سخت دچار بروآمدگی محدود به پاریتال راست در ناحیه جمجمه گردیده است که به نظر نمی رسد پیشرونده داشته باشد، علائم عصبی خاصی مشهود نیست کدامیک از تصریه های زیر امتیازی ندارد

- الف) عمل جراحي**

(ج) تحت نظر گرفته شود و انعام آزمایشات تکمیلی،
د) مشکلکاری وجود ندارد، بهتر است مرخص شود.

ب) آسپیراسیون

سؤال ۵۹ - مصرف کدامیک از داروهای زیر در زمان شیردهی ممکن است در نوزاد ایجاد استقراغ، اسهال و تشنج کند؟

- الف) فنوباربيتال
ج) ارگوتامین

ب) لیتیوم
د) برموکربیتین

سوال ۶ - در صورت عدم پاسخ دهی نوزاد به اقدامات اولیه احیاء پس از چه مدت تلاش، اقدام به تهویه با فشار مثبت ممکن شود؟

- الف) ١٥ ثانية
ج) ٤٠ ثانية
ب) ٣٠ ثانية
د) ٦ ثانية

سوال ۶۱- شایع ترین اندیکاسیون برای آمینو سفتز ژنتیکی چیست؟

- الف) مصرف دارو در مادر
ج) سن بالای مادر

ب) پرتوتابی
د) سن بالای پدر

سؤال ۶۲- مصروف اکسی توسعہ در مادر چه تأثیری در جنین دارد؟

- الف) هیپوبیلی روئینمی
ج) هیپوکلسما

ب) هیپرబیلی روئینمی
د) هیپرکلسما

سوال ۶۳ - اتساع شکم نوزاد در بدو تولد نشافه چیست؟

- الف) پارگی مجرای گوارشی
ج) سپسیس
ب) فتق دیافراگمی
د) پریتونیت

سؤال ۶۴ - کدامیک از عفونت های زیر از طریق سرویکس به جنین منتقل می شود؟

- الف) سرخجه
ج) مالاريا

سؤال ۶۵ - فونتافل قدامی کوچک احتمال چه بیماری را مطرح می کند؟

- الف) هیدروسفالی
ج) هایپرتریوئیدیسم مادرزادی

ب) هایپوتیروئیدیسم مادرزادی
د) آکندروپلازی

سوال ۶۶- کدامیک از وضعیت های زیر در همراهی با الیگوھیدرآمنیوس دیده نمی شود؟

- الف) تأخير رشد رحمي
الج) آنانسفالى

ب) آزنزى كلية
د) آمنيون ندو زوم

سؤال ۶۷ - در ارتباط با منحنی رشد یک نوزاد فول قرم کدام جمله صحیح است؟

- الف) جهه موقع تولد انعکاسی از اثر محیط رحمی دارد.
ب) در ۲ سالگی با میانگین قد والدین ارتباط دارد.

ج) در نوزاد با جثه بزرگ و والدین کوچک تا ۱۸ ماهگی به طرف پایین تر منحنی انتقال می یابد.

د) در نوزاد با جثه کوچک پس از ۱۸ ماهگی اغلب به طرف صدک میانگین والدین افزایش می یابد.

سوال ۶۸ - در پایش رشد جهت جلوگیری از اشتباه در تشخیص اختلال رشد نوزادن ۳۵ هفته متولد شده چه نکته‌ای را باید در نظر داشت؟

- الف) افزودن تعداد هفته های نارسی به سن پس از تولد
 (ج) تفاوتی با سایر توزیعات ندارد.

ب) کسر تعداد هفته های نارسی از سن تولد
 د) پایش رشد را از زمان تولد حساب می کنیم.

سوال ۶۹ - نوزادی با ویژگی های زیر متولد شده است: موهای لانگوی فراوان، آرئول صاف، لاله گوش نرم با افحنای مختصر و لابیا مینورهای برجسته، از نظر اجزاء معیارهای عصبی عضلانی Ballard در هر قسمت نمره یک مم کرد. طبق معدار حدید Ballard حدوداً چند هفتة است؟

- الف) ٢٦ - ٢٨
ج) ٢٠ - ٢٢
ب) ٣٢ - ٣٤
د) ٣٧ - بـ مـ الـ

سؤال ۷۰- کدام عبارت در خصوص آسیب‌های حین زایمان بر روی نخاع و ستون مهره‌ها صحیح است؟

- الف) عموماً این ضایعات باعث فلیج کامل اندام فوکانی می شود.

ب) آسیب های وارده به نخاع معمولاً موقتی است و به طور خودبخودی بهبود می یابد.

ج) در نمایش سفالیک بیشترین آسیب در سطح مهره چهارم گردنی است.

د) آسیب به ستون، فقرات عموماً به دلیا، تار سب، استیت کشیش، شدید استئون، فقرات.

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته مامایی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۷۱ - وجود کدامیک از تغییرات پوستی در معایینات اولیه نوزاد ۳ - ۱ روزه غیر طبیعی تلقی شده و نیاز به بررسی بیشتر دارد؟

- (ب) رنگ پریدگی
(د) آکروسیانوز

(الف) Mottling به نتیجه گیری کردن
(ج) اریتما توکسیکوم

سؤال ۷۲ - در بررسی وضعیت یک نوزاد به ظاهر سالم هنگام ترجیح از اتفاق زایمان یا بستری مجدد انجام کدام معاینه از نظر قلبی ضروری است؟

- (الف) انجام ECG برای شمردن ضربان قلب و پایش قلب
(ب) برآورد اندازه قلب و بررسی سوکل های قلبی
(ج) اندازه گیری فشار خون به روشن اسیلو متري
(د) گرفتن نبض اندام فوقانی و تحتانی برای بررسی کوارکتاسیون آثرت

سؤال ۷۳ - مصرف کدامیک از داروهای زیر برای مادر شیرده ممنوع است؟

- (ب) سایمیدین
(د) مترونیدازول

(الف) ضد تشنج
(ج) ضد فشارخون

سؤال ۷۴ - در حال حاضر کدامیک از غربالگری های هنگام تولد در کشور به صورت روتین انجام می شود؟

- (ب) هیپوتیروئیدی
(د) هیپوکلسیمی

(الف) نیابت ملیتوس
(ج) تالاسمی

سؤال ۷۵ - کدامیک از موارد زیر درباره IUGR صحیح است؟

- (الف) با افزایش تولید انسولین در سطح گیرنده ها همراه است.
(ب) ممکن است پاسخ طبیعی جنین به محرومیت اکسیژن باشد.
(ج) در ارتباط با محرومیت غذایی جنین نمی باشد.
(د) نوع غیر قرینه اغلب زودتر از نوع قرینه آن ایجاد می شود.

بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

سؤال ۷۶ - شاخص توسعه انسانی HDI، یک شاخص مرکب از نشانگرها در سه بعد، است.

- (الف) طول عمر، دانش، درآمد
(ب) امید به زندگی، میزان با سوادی بزرگسالان، درآمد
(ج) طول عمر، شاخص ناخالص ثبت‌نام مختلط، GDP

سؤال ۷۷ - شاخص کیفیت زندگی جسمی یک از نشانگر مرکب از می باشد.

- (الف) امید به زندگی، میزان درآمد و میزان با سوادی
(ب) مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی و میزان درآمد
(ج) مرگ و میر شیرخواران، امید به زندگی در یکساگی و میزان با سوادی
(د) مرگ و میر شیرخواران، میزان با سوادی و میزان درآمد

سؤال ۷۸ - در شهر X با ۸۰۰۰ مورد موالید زنده و ۲۰۰۰ مورد موالید مردہ در سال ۱۳۸۰، ۴۰۰ مورد مرگ کودک زیر ۲۸ روز و ۸۰۰ مورد مرگ کودک زیر یکسال رخ داده است. IMR شهر X عبارتند از:

- (ب) ۵ در هزار
- (الف) ۱۰ در هزار
- (ج) ۴ در هزار

سؤال ۷۹ - نشانگری که در اندازه‌گیری سلامت مردم مختلف در شرایط همانند پاسخ یکسان نمیدهد، نشانگری است.

- (ب) Reliable
- (الف) Valid
- (ج) Sensitive

سؤال ۸۰ - کدامیک از گزینه‌های زیر از عوارض مشترک بین *Bulimia* و *Anorexia nervosa* در دختران نوجوان محسوب می‌شود؟

- (ب) وادار کردن خود به استفراغ
- (الف) زیاده روی در خوردن غذا
- (ج) همیوتورمی

سؤال ۸۱ - حداقل رشد و تغییر شکل و ترکیب بدن در کدام مرحله از بلوغ رخ می‌دهد؟

- (ب) SMR2-3
- (الف) SMR1
- (ج) SMR5
- (د) SMR3-5

سؤال ۸۲ - کدامیک از جملات زیر در خصوص کنترل اجابت مزاج و ادرار صحیح است؟

- (الف) تفاوت‌های فردی و فرهنگی تأثیری بر زمان کنترل اجابت مزاج و ادرار ندارد.
- (ب) توانایی کنترل ادرار در طول روز پس از کنترل مدفع در کودکان اتفاق می‌افتد.
- (ج) خیس کردن رختخواب در دختران تا ۴ سالگی طبیعی است.
- (د) قطع آموزش توالت و استفاده مجدد از کنه باعث اختلال در کسب مهارت دفع می‌شود.

سؤال ۸۳ - تفکر سمبیک و شکل گیری رفتار نو در چه سنی در کودک اتفاق می‌افتد؟

- (ب) ۱۸ ماهگی
- (الف) ۱۲ ماهگی
- (ج) ۲۵ ماهگی
- (د) ۲۰ ماهگی

سؤال ۸۴ - آموزش همگانی در خصوص منع کودکان از پیش گرفتن شیوه زندگی خطرآفرین جزء کدامیک از سطوح پیشگیری محسوب می‌شود؟

- (ب) پیشگیری اولیه
- (الف) پیشگیری بدروی
- (د) پیشگیری نوع سوم
- (ج) پیشگیری ثانویه

سؤال ۸۵ - شاخص سولیوان در جامعه ای ۶۵ است. مفهوم آن چیست؟

- (الف) ۶۵٪ از افراد جامعه بدون ناتوانی زندگی می‌کنند.
- (ب) ۶۵٪ از افراد جامعه با ناتوانی زندگی می‌کنند.
- (ج) مقدار تقریبی سالهایی که صرف ناتوانی در جامعه شده است ۶۵ سال است.
- (د) مقدار تقریبی امید به زندگی بدون ناتوانی ۶۵ سال است.

سؤال ۸۶ - هدف داشتن در زندگی و متعهد بودن به چیزی اولی تر جزء کدامیک از ابعاد سلامتی محسوب می شود ؟

- (ب) بعد اجتماعی
- (الف) بعد روانی
- (ج) بعد روحی
- (د) بعد عاطفی

سؤال ۸۷ - اگر برنامه آموزش بهداشت بر پایه نیازهای ملموس جامعه طراحی شود آنگاه کدامیک از اصول آموزش بهداشت را رعایت نموده ایم ؟

- (ب) علاقه
- (الف) قابل قبول بودن
- (ج) مشارکت
- (د) ایجاد انگیزه

سؤال ۸۸ - کدامیک از موارد زیر در مورد قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری صحیح است ؟

- (الف) پروژستینها، تولید فاکتورهای انعقادی را افزایش می دهد.
- (ب) اثر سیگار کشیدن بر ترمومبوزوریدی در مقایسه با ترمومبوز شریانی بیشتر است.
- (ج) هیپرتانسیون یک عامل مهم برای ایجاد سکته مغزی در مصرف کنندگان می باشد.
- (د) ترمومبوز شریانی با دوز پروژسترون بستگی دارد.

سؤال ۸۹ - بیشترین اثر حفاظتی قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری در مقابل سرطان آندومتر در کدامیک از موارد زیر می باشد ؟

- (الف) زنان نولی پار
- (ب) زنان سیگاری
- (ج) زنان مولتی پار
- (د) زنان با سابقه فامیلی

سؤال ۹۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد توبکتومی صحیح است ؟

- (الف) احتمال هیسترکتومی بعد از توبکتومی کاهش می یابد.
- (ب) میزان حاملگی بعدی در روش الکتروکوآگولاسیون در کمترین حد است.
- (ج) میزان حاملگی بعدی بستگی به روش توبکتومی ندارد.
- (د) بهترین زمان برای توبکتومی در هنگام سزارین است.

سؤال ۹۱ - موارد زیر در مورد عمل وازنکتومی صحیح است بجز :

- (الف) با افزایش زمان سپری شده از وازنکتومی، احتمال حاملگی در همسر آنان کاهش می یابد.
- (ب) بهترین نتایج برای برگشت باروری در افراد وازنکتومی شده در مدت ۳ سال است.
- (ج) در اکثر موارد در مردان به دنبال وازنکتومی آنتی باری ضد اسپرم به وجود می آید.
- (د) در مقایسه با توبکتومی با میزان شکست بیشتری همراه است.

سؤال ۹۲ - وجود کدام ماده در رژیم غذایی مانع از جذب روی در کودکان می شود ؟

- (الف) گوشت قرمز
- (ب) سبزیهای سبز تیره
- (ج) قیمتات
- (د) سبوس غلات

سؤال ۹۳ - مادری نوزاد ۱۰ روزه خود را با وزن هنگام تولد ۲۴۰۰ گرم که از ناحیه شکم به پائین زردی واضح دارد به مرکز بهداشتی آورده است. شدت زردی چقدر است؟ آقدم شما چه می باشد؟

(الف) زردی خفیف - شیردهی در دفعات بیشتر و مدت طولانی تر انجام شود.

(ب) زردی ندارد - شیردهی را آدامه دهید

(ج) زردی شدید - ارجاع فوری به تزدیکترین مرکز درمانی

(د) زردی طولانی مدت - ارجاع به مرکز درمانی

سؤال ۹۴ - در معاینه و ارزیابی بالینی کودک ۲/۵ ساله که تأخیر رشد دارد متوجه نقاط کبود و پراکنده‌ای در سطح پشت و شکم می‌شوید. مشکل تأخیر رشد در کدام تقسیم بندی قرار دارد؟

(الف) غیر عضوی - مربوط به رابطه کودک - مادر

(ب) عضوی - تغییر متابولیسم مواد غذایی

(ج) غیر عضوی - خانوادگی

(د) عضوی - افزایش اتلاف مواد غذایی

سؤال ۹۵ - برای کودک ۱۸ ماهه‌ای که ۳ روز قبل پلاسما تزریق شده با چه فاصله زمانی واکسن پولیو را تجویز می‌نمایند؟

(الف) ۶ ماه بعد از تزریق

(ب) در نوبت بعدی واکسیناسیون

(ج) در زمان مراجعه

(د) ۳ ماه بعد از تزریق

سؤال ۹۶ - همه عالائم زیر از نشانه‌های کفايت شیرمادر در تغذیه انحصاری شیرخوار است، بجز:

(الف) ۶-۸ بار دفع ادرار در ۲۴ ساعت بصورت کهنه کاملأ خیس

(ب) خواب بسیار سبک شیرخوار بعد از تخلیه دو پستان

(ج) روزانه ۲-۵ بار دفع مدفع و کاهش آن با افزایش سن

(د) هوشیاری، سلامت ظاهری و شادابی پوست

سؤال ۹۷ - کدام ماده موجود در شیر مادر عامل مهار E-Coli در روده کودک است؟

(الف) لاکتوفرین

(ب) ایمونوگلوبولین

(ج) آمیلاز

(د) کازئین

سؤال ۹۸ - نوزاد مادر HBSAg+ که قبل از تشخیص بیماری مادر تزریق واکسن هپاتیت ب داشته، با چه فاصله زمانی بعد از تلقیح، ایمونوگلوبولین باید دریافت نماید؟

(ب) یک هفت

(د) دو هفته

(الف) یک ماه

(ج) نیاز ندارد

بیماری‌های داخلی جواحت مریبوط به مامایی

سؤال ۹۹ - کدام عبارت در مورد کم خونی آدیسونین (Addisonian) صحیح است؟

(الف) بیماری خود اینمی نیست.

(ب) بسیار شایع است.

(ج) در زیر سن ۴۰ سالگی آغاز می‌شود.

(د) ناباروری یکی از عوارض آن است.

سؤال ۱۰۰ - مواد زیر استفاده از تغذیه پارنترال در حاملگی است، بجز:

(الف) انسداد روده

(ب) سوختگی

(ج) صرع

(د) لوسیمی

سؤال ۱۰۱ - کدامیک از مواد زیر جزء عوارض دیالیز در حاملگی نیست؟

(الف) هیپرتانسیون

(ب) سپسیس

(ج) نارسائی تنفسی

(د) نارسائی قلبی

سؤال ۱۰۲ - شایع‌ترین علت انسداد روده در حاملگی کدام است؟

(الف) آپاندیسیت

(ب) چسبندگی

(ج) سرطان

(د) ولولوس روده

سؤال ۱۰۳ - در کدامیک از حالات زیر نیاز به اسید فولیک افزایش نمی‌یابد؟

(الف) چند قلوئی

(ب) الکلیسم

(ج) بیماری التهابی پوست

(د) بیماری التهابی کبد

سؤال ۱۰۴ - بهترین درمان سیفلیس در زنان حامله ای که به پنی سیلین آرژی دارند چیست؟

(الف) سفتیراکسون

(ب) اریتروماسین

(ج) تراسیکلین

(د) حساسیت زدایی از پنی سیلین

سؤال ۱۰۵ - کدام علامت جزء تیروئیدیت بعد از زایمان نیست؟

- (الف) افسردگی
- (ب) خواب آلودگی
- (ج) اختلال حافظه
- (د) بی‌دقشی

سؤال ۱۰۶ - مصرف بیش از حد استامینوفن در حاملگی سبب چه عارضه‌ای می‌گردد؟

- (الف) نارسائی حاد کبد
- (ب) نارسائی حاد کلیه
- (ج) نارسائی حاد ریه
- (د) نارسائی حاد قلب

سؤال ۱۰۷ - کدام جمله در مورد پنومونی در حاملگی صحیح نیست؟

- (الف) ایجاد هیپوکسی می‌کند.
- (ب) ایجاد اسیدوز می‌کند.
- (ج) نیاز به رادیوگرافی از قفسه سینه دارد.
- (د) رادیوگرافی از قفسه سینه به بعد از حاملگی موكول می‌شود.

سؤال ۱۰۸ - در خانم مبتلا به آسم، در هنگام لیبروزایمان کدام مورد غلط است؟

- (الف) دوز استرس کورتیکوستروئید به تمام زنانی که در عرض ۴ هفته قبل تحت درمان با استروئید سیستمیک بوده اند، تجویز می‌شود.

(ب) کورتیکوستروئید معمول، ۱۰۰ mg هیدروکورتیزون وریدی، هر ۸ ساعت است.

(ج) برای لیبر مپریدین به فنتانیل ارجحیت دارد.

(د) در زایمان سزارین، آنالژزی هدایتی ارجحیت دارد.

سؤال ۱۰۹ - در درمان دیابت در بارداری کدامیک از موارد زیر غلط است؟

(الف) برای شروع درمان، دوز کلی ۲۰-۳۰ واحد، یک بار در روز و قبل از صبحانه تجویز می‌شود.

(ب) دوز تام عموماً به دو سوم "انسولین با اثر کوتاه" و یک سوم "انسولین با اثر متوسط" تقسیم می‌شود.

(ج) اندازه گلوکز "بعد از غذا" بر سنجه گلوکز "قبل از غذا" ارجحیت دارد.

- (د) انسولین درمانی در صورتیکه هیپرگلیسمی ناشتا با وجود درمان تغذیه‌ای بیشتر از ۱۰۵mg باشد، شروع می‌شود.

سؤال ۱۱۰ - در زنان مبتلا به هیپرتانسیون مزمن شدید یا پره اکلامپسی، کدام مورد زیر غلط است؟

(الف) احتمال اختلال عملکرد کلیوی در ۲۴ ساعت اول زیاد است.

(ب) این زنان دارای حجم خون بیشتری نسبت به زنان باردار طبیعی هستند.

(ج) برای تأمین پرفورزیون بافتی ممکن است ترانسفوزیون خون لازم باشد.

(د) این زنان دچار انقباض عروقی شدید هستند و خون زیادتری از دست می‌دهند.

زبان عمومی**Part one : Reading Comprehension**

Directions : Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it . Choose the one best answer, (a) , (b), (c) , (d) to each question . Then on your answer sheet, fill in the space that, corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only.

Passage ONE :

Hyperbaric Oxygen Therapy (or HBOT) in veterinary medicine is the same as human medicine, that is, the delivery of 100% oxygen under pressure to the “patient”. In this case the patient rather than being a human, is an animal. The pressure we use is generally 1.5 to 2.4 atmospheres (a pressure equal to that produced by 16 to 46 feet of seawater). The pressure is provided using a monoplace stainless steel pressure chamber that looks similar to diving decompression chambers used on ships. Clients tell us that it resembles a mini-submarine with two portholes and a “hatch” at one end. It is approximately 3 feet in diameter and 4 $\frac{1}{2}$ feet long (photo). Oxygen at high flow is infused into the chamber until the desired pressure is reached. This generally takes 10 minutes to reach the desired pressure in our animal patients. We observe them through the portholes and note any changes in their attitude that might indicate some distress (presumably due to pressure changes in the sinus or middle ear). It has been rare to have to stop the descent but on occasion we have slowed the descent down because of observed discomfort. In animals that are very excited, we tranquilize with a phenothiazine-based anxiolytic such as acetylpromazine. Most animals become comfortable in the chamber, only requiring a small amount (1/2-1 mg) of the tranquilizer. Occasionally, up to 2-3 mg will be required. The treatment times begin when the desired pressure is reached and they range from 30 minutes to 2 hours, depending on the patient’s condition and the indication for which it is being used. Most treatment times average one hour. Decompression, which takes another 10 minutes, is then accomplished and the patient is removed from the chamber.

111. The Hyperbaric Oxygen Therapy is.....

- a. specific to human medicine
- b. limited to veterinary medicine
- c. used for an animal rather than a human patient
- d. applied to human or veterinary medicine

112. The pressure chamber providing the pressure is.....

- a. generally installed on ships
- b. lacking portholes and hatch
- c. a diving decompression chamber
- d. similar to a mini-submarine

113. The underlined term “portholes” (line 6) is synonymous with.....

- a. gates
- b. cavities
- c. windows
- d. doors

114. The time taken for the “chamber” to reach the desired pressure seems to based on the patient condition.

- a. remain constant
- b. fluctuate
- c. be of no significance
- d. overlap

115. The writer uses the term “descent” (line 11) to indicate the the chamber.

- a. transfer of a tranquilizer into
- b. spread of pressure in
- c. discomfort of animal patient in
- d. infusion of oxygen into

116. The pronoun “they” (line 15) refers to

- a. treatment times
- b. desired pressures
- c. patient's conditions
- d. the indications

117. Decompression (last sentence) follows the

- a. desired pressure achievement
- b. patient treatment
- c. tranquility achievement
- d. acetyl promazine application

Passage TOW :

Alcohol intoxication and alcohol withdrawal can both be fatal in certain circumstances. These patients deserve to be treated as medical problems, not as social nuisances. It is tempting, at times, for health care personnel to be truly annoyed with the “drunks” who fall, hit their heads, get into fights, and use abusive language. It is imperative, however, that rough handling, punishment, or verbal reprimands be avoided. Such actions will not deter future use of alcohol and certainly are not helpful in managing the crisis at hand. A word of caution is in order, too, regarding our social biases about the appearance of the “drunk.” A well-dressed and refined elderly lady can be acutely intoxicated, too. The EMT must be on guard and not make assumptions about the patient merely by his appearance of where he is found. A carefully taken history and a thorough physical assessment are vital to identification of serious alcohol-related problems.

118. The social harms caused by the alcoholics..... by the medical staff.

- a. should particularly affect the treatment provided
- b. are to be dealt with
- c. should remain independent of the care offered
- d. used to be taken care of

119. Health care personnel..... socially annoying drunks.

- a. are basically indifferent to
- b. are sometimes inclined to get harsh at
- c. should react violently against
- d. should criticize the actions performed by

120. The writer.....rough actions against nuisance drunks.

- a. intentionally recommends
- b. remains indifferent toward
- c. seems to be unaware of
- d. openly stands against

121. The drunk.....appearance.

- a. are categorically worse than usual in
- b. may be quite neat and tidy in
- c. find it quite useful to adopt an unusual
- d. can easily be recognized with his refined

122. The type of cover and place.....identifying the drunk.

- a. may fail to be accurate measures in
- b. are the recommended criteria for
- c. may be used by the medical personnel for
- d. are not referred to despite their significance in

123. The last sentence mainly deals with ways of

- a. obtaining a life history
- b. achieving proper diagnosis
- c. removing alcoholic problems
- d. performing physical assessment

Passage THREE :

Allergy is a condition of sensitivity to substance, chemically a protein, which is called an allergen. The allergic person reacts in a way that others do not, when they eat, inhale or touch the allergen. Allergy is a normal protective mechanism that has gone off the rails. It is a useful defence for the nose to pour forth its watery secretion to wash out a harmful irritant or bacterial toxin, but plain maddening if it does the same thing for a grain of Timothy grass pollen.

Why some and not others should react in this violent way is still a mystery. Hereditary disposition is of indisputable importance in many cases, but the form the allergy takes may vary from parent to child, e.g. an asthmatic father may have a daughter who is allergic to bee stings. A common story in an allergic person is of eczema in infancy, hay fever or rhinorrhoea in later childhood, and asthma as an adult.

124. Allergens act.....in their victim's body.

- a. Categorically
- b. chemically
- c. randomly
- d. selectively

125. The allergic person.....others in his reaction to allergens.

- a. is afflicted by
- b. is distinct from
- c. resembles
- d. represents

126. As a usual supportive mechanism, an allergen.....to anybody.

- a. can be beneficial
- b. is hazardous
- c. remains ineffective
- d. serves as an irritant

127. Allergy can be disturbing.....

- a. under any circumstance
- b. when it surpasses the limit
- c. regardless of its size
- d. if it is slighter than usual

128. Factors accounting for allergy are.....

- a. left to the reader to identify
- b. far from being resolved
- c. reportedly confined to heredity
- d. enumerated in the text

129. The son of a mother allergic to house-dust.....

- a. is unlikely to suffer an allergy
- b. can be prone to another allergen
- c. would remain allergic to the same substance
- d. has acquired immunity against allergens

130. The same person.....allergens over time.

- a. remains allergic to similar
- b. would develop immunity against
- c. tends to shift in sensitivity to type of
- d. would pass his offspring immunity against

passage FOUR :

Equity is a multi-faceted concept. From an ethical perspective, equity requires adherence to both substantive and procedural principles. The formal principle of equity is often stated as “treat like cases alike and different cases differently”. Egalitarian theories call for distributing resources equally among different persons or groups, which could mean that everyone should receive the same access to health services. The “maximin” principle calls for giving preference to those who are worst off, for example the poorest, the most vulnerable or the sickest. The principle of reciprocity or compensation calls for providing something in return for contributions that people have made, for example individuals who have participated in AIDS treatment trials, or compensation for a harm by the system, such as having been the recipient of unsafe blood transfusions. Finally, utilitarian theories require that overall societal benefits be maximized.

131. The paragraph implies that the term “equity” egalitarian theories.

- a. is indeed related to
- b. contradicts the ideas of
- c. hardly centers around
- d. is intentionally alienated from

132. The formal principle of equity maintains that cases should be treated

- a. in the same way, disregarding their background
- b. regardless of their common features
- c. irrespective of their differences
- d. variably as they deserve

133. According to egalitarian theories, health services should be

- a. distributed differently from other resources
- b. evenly available to different individuals
- c. limited to the most vulnerable groups
- d. accessible to similar groups of people

134. According to a volunteer for a new malaria vaccine is to be rewarded back in return.

- a. utilitarian theories
- b. maximin principle
- c. reciprocity principle
- d. conceptual theories

135. The victims of unsafe blood transfusion are expected to be by the system.

- a. duly accounted for
- b. partially compensated
- c. essentially ignored
- d. paid more than they deserve

part two : Vocabulary :

Directions: The following are incomplete sentences . Below each one are four words or phrases marked (a) , (b) ,(c) , (d) . Choose the one word or phrase which best completes the sentence.

136. The huge number of road may indicate that policies on granting the driver's license have to be revised.

- a. fatalities
- b. infrastructures
- c. renovations
- d. traffickers

137. The medical advisor's of the hypotheses caused the whole research to be abandoned.

- a. disruption
- b. disapproval
- c. appreciation
- d. confirmation

138. With the of modern technological developments in the realm of electrocardiography, many heart problems can be diagnosed in their early stages.

- a. revolt
- b. advent
- c. converse
- d. aversion

139. The patient's longstanding condition has been by his continual epileptic seizures.

- a. Exacerbated
- b. exasperated
- c. perpetuated
- d. proliferated

140. Occasionally, a patient is so..... that he/she must be fed intravenously.

- a. depreciated
- b. debilitated
- c. defamed
- d. depraved

141. Only a small quantity of aspirin is needed to pain as a large amount may harm the body.

- a. elevate
- b. provoke
- c. accompany
- d. alleviate

142. Some people take medicine whenever they feel ill, but others prefer to let the body itself naturally.

- a. reveal
- b. interrupt
- c. withdraw
- d. rehabilitate

143. As we age, some qualities are while others are reaching their peak.

- a. persuading
- b. flourishing
- c. deviating
- d. diminishing

144. In some developing countries, the traditional healers a lot of fame and popularity.

- a. enjoy
- b. denote
- c. supply
- d. contain

145. Some techniques such as MRI and CT scan cannot be performed in ordinary laboratories today.

- a. Trivial
- b. primitive
- c. compulsive
- d. sophisticated

146. After lots of research, scientists have the effectiveness of some home remedies. That's why most doctors prescribe them.

- a. denied
- b. verified
- c. suspected
- d. challenged

147. The patient's condition will be if proper measures are not taken.

- a. refuted
- b. spotted
- c. aggravated
- d. aggregated

148. All dieticians hold the idea that junk foods have impacts on our health by disturbing our appetite for natural diets.

- a. detrimental
- b. congenital
- c. promoting
- d. promising

149. Pills for allergy often drowsiness, so it is better not to take them when driving.

- a. induce
- b. eliminate
- c. overcome
- d. invalidate

150-. The materials used in this instrument must be able to high temperatures since it is usually exposed to high degrees of heat.

- a. compromise
- b. withstand
- c. ventilate
- d. achieve

موفق باشد